

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

“飲み過ぎ、胃もたれ、胸やけ、食欲不振、胃痛に”

総合胃腸薬 ハイマックス

第2類医薬品

特徴

ハイマックスは、胃の痛みをやわらげるロートエキス、胃酸過多をおさえる炭酸水素ナトリウム、重質炭酸マグネシウム、胃粘膜を保護するメタケイ酸アルミン酸マグネシウム、消化・分解を助ける酵素ビオチンアスターゼを配合した現代の食生活、生活環境に適合した緑色顆粒の服用しやすいスティックタイプの胃腸薬です。胃の痛み、胃酸過多、食べ過ぎ、胃もたれなどに優れた効果があり、食後に1包服用してください。

▲ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなる。)

1. 次の人は服用しないこと。
透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと。
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること。
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある。)
4. 長期連用しないこと。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。排尿困難
(6) 次の診断を受けた人。腎臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。 口のかわき、便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

📌 その他の注意

母乳が出にくくなる可能性がある。

効能・効果

胃痛、食べ過ぎ(過食)、消化促進、食欲不振(食欲減退)、胸つかえ、はきけ(むかつき)、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心、もたれ(胃もたれ)、胸やけ、消化不良、胃酸過多、胃部不快感、胃部膨満感、胃重、げっぷ(おくび)、嘔吐、飲み過ぎ(過飲)、消化不良による胃部・腹部膨満感

用法・用量

次の量を食後に服用してください。

年齢	1回量	服用回数
15才以上	1包	1日3回
11才以上15才未満	2/3包	
8才以上11才未満	1/2包	
5才以上8才未満	1/3包	
3才以上5才未満	1/4包	
3才未満	服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】

1. 定められた用法・用量を厳守してください。
2. 小児に服用させる場合は、保護者の指導監督のもとに服用してください。

成分・分量 1日量 3包中(1包1.0g×3)

成分	分量	主な作用
炭酸水素ナトリウム	700mg	胃酸を中和し胃の痛み、胸やけ、げっぷなどの症状をやわらげ胃壁を保護する。
重質炭酸マグネシウム	600mg	
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	900mg	
ビオチンアスターゼ	350mg	デンプン、タンパク質、繊維及び脂肪の消化を助ける。
ロートエキス散(ロートエキス30mg 乳糖水和物適量)	300mg	胃の緊張をやわらげ胃酸の分泌を抑え痛みを和らげる。

添加物として、乳糖水和物、ヒプロメロース、銅クロロフィリンナトリウム、*l*-メントール、リコチミン-N-Pを含む。

【成分に関連する注意】

本剤の服用により便が緑色になることがありますが、銅クロロフィリンナトリウム(緑色)によるものですから心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 配置期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。
5. 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

本品についてのお問い合わせは、下記にお問い合わせください。
至誠堂製薬株式会社 TEL.0745(62)5555
受付時間 10:30~15:00(土、日、祝日を除く)
お客様相談室へ

製造販売元



至誠堂製薬株式会社

〒639-2241 奈良県御所市茅原220-1