

“せき、たん、ぜんそくに”

(鎮咳去痰薬)

# 新セキコデチン

第②類医薬品

## 特徴

せきは、のどや気管支の病気に伴って起こる症状です。せきが長く続くと、のどを痛めたり、声がかすれるだけでなく肺に必要以上の刺激を与え、血圧等が高くなり、体力が消耗し、病気に対する抵抗力も弱ります。

新セキコデチンは、そんなときに、せきをしずめ、たんを伴うせきにも効果的な医薬品です。

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと。  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと。(眠気等があらわれることがある。)

### 🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 授乳中の人。
  - (4) 高齢者。
  - (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (6) 次の症状のある人。高熱、排尿困難
  - (7) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

(裏面に続く)

- 3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。 口のかわき、眠気
- 4.5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

## 効能・効果

せき、たん、ぜんそく

## 用法・用量

次の量を食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	15歳以上	15歳未満
1 回 量	1カプセル	服用しないこと
服用回数	1日3回	

### 【用法・用量に関連する注意】

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 製剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)

## 成分・分量 1日量(3カプセル中)

成 分	分 量	作 用
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支をひろげ、せきをしずめます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	9mg	せきやたんの原因となるアレルギー症状をおさえます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	270mg	気道粘膜についているたんをうすめて出しやすくすると共にせきをしずめます。
無水カフェイン	120mg	せきによる不快感を和らげ、ねむけを除きます。

添加物として、結晶セルロース、無水リン酸水素カルシウム、タルク、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒドロキシプロピルスターチ、ゼラチン、酸化チタン、ラウリル硫酸ナトリウム、マクロゴールを含む。

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 配置期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。  
至誠堂製薬株式会社 TEL.0745(62)5555  
受付時間 10:30～15:00(土、日、祝日を除く)  
お客様相談室へ

製造販売元



**至誠堂製薬株式会社**

〒639-2241 奈良県御所市茅原220-1

SS-2