



ここからお切りください。

開封後はチャックを閉じて保存してください。 **チャック**

**ヘルスナビン 365** **指定医薬部外品**

販売名:モイスフル

服用の際はこの説明文を必ずお読みください。

**△ 使用上の注意**

**相談すること**

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 **下痢**

3. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

**【効能・効果】**

- 体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善
- 疲労の回復・予防
- 虚弱体質(加齢による身体虚弱を含む。)に伴う身体不調の改善・予防
- 日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防
- 肩、首、腰又は膝の不調
- 疲れやすい、疲れが残る、体力がない、身体が重い、身体がだるい
- 肌の不調(肌荒れ、肌の乾燥)
- 冷えやすい、血行が悪い
- 骨又は歯の衰え
- 二日酔いに伴う食欲の低下、だるさ
- 病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

**【用法・用量】**

次の量を水又はお湯にて服用してください。

年齢	成人(15歳以上)	15歳未満
1 回量	3錠	服用しないこと
服用回数	1日1回	

**〈用法・用量に関連する注意〉**

用法・用量を守ってください。(他のビタミン等を含有する製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意してください。)

使用期限

**【成分・分量】1日量(3錠中)**

成分	分量
アスコルビン酸(ビタミンC)	500mg
L-システイン	120mg
リボフラビン(ビタミンB <sub>2</sub> )	3mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB <sub>6</sub> )	6mg
コハク酸d-α-トコフェロール(ビタミンE)	25mg

添加物: トウモロコシデンプン、結晶セルロース、クロスカルメロースナトリウム、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴール

**〈成分・分量に関連する注意〉**

①本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響をおよぼすことがありますので、これらの検査を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせください。②本剤の服用により尿が黄色くなる場合がありますが、これは本剤に含まれるリボフラビン(ビタミンB<sub>2</sub>)によるものですから、ご心配ありません。

**【保管及び取り扱い上の注意】**

- ①直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所にチャックを閉じて保管してください。
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質に影響が出る場合がございます。)
- ④水分が錠剤に付着しますと、表面の一部が溶けて、変色又は色むらを生じることがあります。ぬれた手で触れないようにご注意ください。
- ⑤袋の中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。
- ⑥使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお期限内であっても、一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月内に服用してください。

**お問い合わせ窓口(お客様相談室)**

☎0745-62-5555

受付時間: 10:30~15:00

(土、日、祝日を除く)

製造販売元 至誠堂製薬株式会社  
奈良県御所市茅原 220-1

希望小売価格: 3,800円 + 税

製造番号

版No.1

